

Dane aktualne na dzień: 02-05-2026 14:51

Link do produktu: <https://lekidlazwierzat.pl/coloceum-plus-60-ml-p-149.html>

COLOCEUM PLUS 60 ml



Cena **87,00 zł**

Dostępność **Dostępny**

Czas wysyłki **48 godzin**

Opis produktu

ColoCeum Plus 60 ml

Produkt do stosowania w przebiegu ostrej biegunki i w okresie

rekonwalescencji u psów i kotów

Opis
Smakowita pasta o kompleksowym działaniu, wspomagająca w problemach przebiegających z biegunką o różnej etiologii:

- infekcje wirusowe, bakteryjne, inwazja pasożytnicza
- nagła zmiana diety, alergię, nietolerancja pokarmowa, zatrucie pokarmowe,
- działanie toksyn
- antybiotykoterapia o szerokim spektrum, zaburzenia mikroflory jelit
- sytuacje stresowe lub wyczerpanie
- nieswoiste zapalenia jelit, enteropatie różnego pochodzenia

Właściwości

Pasta posiada w składzie

pięć aktywnych składników regulujących prawidłowe działanie jelit

montmorillonit/senektyn

- silny i skuteczny adsorbent, wiąże szkodliwe czynniki i toksyny, chroni i powleka śluzówkę przewodu pokarmowego

prebioty

- mannano-oligosacharydy (MOS) - stymuluje rozwój i pomaga przywrócić fizjologiczną mikroflorę jelit

elektrolit

- przywracają równowagę wodno-elektrolitową

d

ekstroza

- stanowi źródło łatwo przyswajalnej energii

L-glutamina

- zapewnia energię dla enterocytów, przez co wspiera regenerację nabłonka jelit

Skład

Dekstroza 25%, Ekstrakt z drożdży (źródło mannano-oligosacharydów - MOS) 20%, Gliceryna (glicerol) 15%, L-Glutamina 0,5%, Chlorek sodu, Chlorek magnezu, Chlorek potasu

Dozage:

grupa 1-g:

Bentonit-montmorillonit (E 558) 40%
Składniki analityczne i poziomy:

Węglowodany 42%, Białko surowe Elektrolity:

Sód 1,5%, Potas 0,3%, Magnez 0,3%

Dawkowanie

6-15 kg m.c. 2 ml rano i 2 ml wieczorem (4 ml dziennie)

16-25 kg m.c. 3 ml rano i 3 ml wieczorem (6 ml dziennie)

26-35 kg m.c. 5 ml rano i 5 ml wieczorem (10 ml dziennie)

36-50 kg m.c. 7 ml rano i 7 ml wieczorem (14 ml dziennie)

> 50 kg m.c. 10 ml rano i 10 ml wieczorem (20 ml dziennie)

Przed użyciem zaleca się konsultację z lekarzem weterynarii.

Podawać doustnie według podanych powyżej dawek lub zalecenia lek.wet., zalecany czas stosowania 1-2 tygodnie.

W łagodniejszych przypadkach może wystarczyć 3-dniowe podawanie pasty.

Jeśli jest konieczne podawanie pasty dłużej niż 3 dni, zwykłe po trzecim dniu stosowania można zmniejszyć podawaną porcję o połowę.
Tłoczek strzykawki wyskalowany jest co 1ml.

Odpowiednią ilość pasty odmierza się przekręcając pierścień na tłoku strzykawki.

Następnie odmierzoną porcję wyciska się bezpośrednio do jamy ustnej zwierzęcia, w razie potrzeby można zmieszać z niewielką ilością karmy, upewniając się, że cała porcja zostanie zjedzona.
Należy zapewnić odpowiednią podaż płynów.

Przechowywać w suchym miejscu, w temperaturze pokojowej.

Wyłącznie dla zwierząt. Przechowywać w miejscu niedostępnym dla dzieci.

Opakowanie

60 ml tłoczek strzykawki posiada zaznaczone podziałki

Producent

CF Pharma Ltd., Irlandia

Dystrybutor:

ScanVet Poland Sp. z o.o.